

## RETRASO EN EL LENGUAJE

# El retraso en el habla de los bebÃ©s y niÃ±os debe ser diagnosticado lo antes posible

Seminario 2 - 23/02/2010

Â

## EL DIAGNÃ“STICO: CUANTO ANTES MEJOR

Sin embargo, antes de prescribir un diagnostico de trastorno especÃ­fico del lenguaje, es imprescindible descartar, mediante un diagnÃ³stico diferencial, una serie de criterios como:

- No existencia de deficiencia auditiva.
- No presencia de trastorno neurolÃ³gico.
- Un Coeficiente Intelectual (CI) superior a 80.
- La no existencia de otras Ã¡reas del desarrollo afectadas como la memoria, ritmo, motricidad,...

Cuando el retraso del niÃ±o aparece SOLO EN EL HABLA nos encontramos con algunas caracterÃ­sticas que pueden ser observadas en esos casos:

- AlteraciÃ³n en el orden de las sÃ­labas (cocholate por chocolate).
- AsimilaciÃ³n de consonantes (fufanda por bufanda).
- Ausencia de grupos consonÃ¡nticos (teno por tengo).
- Sustituciones (pistina por piscina).

## DISFASIA

Pero si ademÃ¡s del habla, el niÃ±o tambiÃ©n presenta afecciones en el lenguaje, tendrÃ¡ dificultades en el uso de pronombres, artÃ­culos, tiempos verbales,... siendo su lenguaje muy difÃ­cil de entender. En ese caso estamos hablando de una disfasia.

Los niÃ±os que presentan retraso en el lenguaje, ya sea leve o severo, han de ser diagnosticados por un especialista lo antes posible, ya que una intervenciÃ³n temprana evitarÃ¡ el aparecimiento de posibles secuelas que podemos traducir por difluencias en el habla (tartamudez), logo fobias (miedo a hablar), dislexias (dificultades en lecto-escritura), etc.

El retraso del lenguaje es una de las afecciones mÃ¡s frecuentes en una consulta de Logopedia y FoniatrÃ­a.

Noticia subida por: M. Angeles Montalbán Manzano