

RETRASO EN EL LENGUAJE

El retraso en el habla de los beb s y ni os debe ser diagnosticado lo antes posible

Seminario 2 - 23/02/2010

 

EL DIAGN STICO: CUANTO ANTES MEJOR

Sin embargo, antes de prescribir un diagn stico de trastorno espec fico del lenguaje, es imprescindible descartar, mediante un diagn stico diferencial, una serie de criterios como:

- No existencia de deficiencia auditiva.
- No presencia de trastorno neurol gico.
- Un Coeficiente Intelectual (CI) superior a 80.
- La no existencia de otras  reas del desarrollo afectadas como la memoria, ritmo, motricidad,...

Cuando el retraso del ni o aparece SOLO EN EL HABLA nos encontramos con algunas caracter sticas que pueden ser observadas en esos casos:

- Alteraci n en el orden de las s labas (cocholate por chocolate).
- Asimilaci n de consonantes (fufanda por bufanda).
- Ausencia de grupos conson nticos (teno por tengo).
- Sustituciones (pistina por piscina).

DISFASIA

Pero si adem s del habla, el ni o tambi n presenta afecciones en el lenguaje, tendr  dificultades en el uso de pronombres, art culos, tiempos verbales,... siendo su lenguaje muy dif cil de entender. En ese caso estamos hablando de una disfasia.

Los ni os que presentan retraso en el lenguaje, ya sea leve o severo, han de ser diagnosticados por un especialista lo antes posible, ya que una intervenci n temprana evitar  el aparecimiento de posibles secuelas que podemos traducir por difluencias en el habla (tartamudez), logo fobias (miedo a hablar), dislexias (dificultades en lecto-escritura), etc.

El retraso del lenguaje es una de las afecciones m s frecuentes en una consulta de Logopedia y Foniatr a.

Noticia subida por: M.Angeles Montalbán Manzano